


Нутрікомп®

Максимум можливостей в ентеральному харчуванні



готові до використання стандартні і спеціалізовані
рідкі суміші для зондового харчування

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Клінічне харчування

Недостатність харчування пов'язана з важкими хронічними захворюваннями. Даний стан негативно корелює із одужанням, і повинен бути монітованим і, за потребою, коригуватись за рахунок клінічного харчування. Перед початком нутріційної підтримки повинні бути оцінені базові антропометричні дані, такі, як маса тіла і зріст. Вибір між шляхом введення нутрієнтів (оральний/ентеральний або парентеральний) повинен бути застосований в залежності від функціонування шлунково-кишкового тракту.

Формули

Всі суміші **Нутрікомп®** містять нутриційно повноцінні дієти. Вони виробляються згідно GMP (Належна Виробнича Практика) і мають високі стандарти якості. Продукти містять збалансовані жирні кислоти, включаючи ω -3 жирні кислоти риб'ячої олії.

Іноваційна упаковка Монобег® (Monobag®):

- Мішок спадається: не має потреби в додатковій вентиляції = закрита система (краща гігієна)
- Зручність у використанні (інтегрується перфорованим отвором для підвішування мішка на штатив)
- Має ергономічну упаковку, не б'ється

Іноваційна упаковка Монобег® (Monobag®):

зручний і міцний пластиковий пакет




	Характеристика складу	Специфікація г/100 мл	Показання до застосування (рекомендації ESPEN)*
Нутрікомп® Стандарт Нейтральний	Стандартна енергетична формула Не має показань або протипоказань до використання харчових волокон	Енергія – 100 ккал Білки – 3,8 Жири – 3,3 Вуглеводи – 13,8 Харчові волокна – 0	Ранній початок харчування Хірургія Онкологія Онкогематологія Гастроентерологія Нефрологія Захворювання печінки (при відсутності енцефалопатії)
Нутрікомп® Стандарт Файбер Нейтральний	Стандартна енергетична формула Збагачений спеціальним пребіотичним складом харчових волокон	Енергія – 100 ккал Білки – 3,8 Жири – 3,3 Вуглеводи – 13,8 Харчові волокна – 1,5	Геріартрія Неврологічні пацієнти з дисфагією Гострі і хронічні інфекційні захворювання Показання для пребіотиків
Нутрікомп® Енергія Файбер Нейтральний	Високоенергетична високобілкова формула Збагачений спеціальним пребіотичним складом харчових волокон	Енергія – 150 ккал Білки – 7,5 Жири – 5,0 Вуглеводи – 18,8 Харчові волокна – 2,0	Кардіологія Пульмонологія Геріартрія Хронічні інфекційні захворювання Гастроентерологія
Нутрікомп® Діабет	Стандартна енергетична формула Вуглеводи представлені крохмалем Збагачений моно ненасиченими жирними кислотами і антиоксидантами Містить пребіотик	Енергія – 100 ккал Білки – 4,1 Жири – 3,5 Вуглеводи – 12,9 Харчові волокна – 2,0	Цукровий діабет Стресова гіперглікемія Порушена толерантність до глюкози (у т.ч. пацієнти в ОРІТ)
Нутрікомп® Гепа	Високоенергетична формула зі спеціальними амінокислотним складом (молочний білок і розгалужені амінокислоти)	Енергія – 130 ккал Білки – 4,0 Жири – 5,8 Вуглеводи – 15,5 Харчові волокна – 0,6	Цироз печінки Печінкова енцефалопатія при гострих і хронічних захворюваннях печінки
Нутрікомп® Імун	Високоенергетична формула збагачена глютаміном і антиоксидантами (вітаміни А, С, Е, групи В, селен, цинк, мідь)	Енергія – 133 ккал Білки – 6,7 (у т.ч. глютамін 2,0) Жири – 3,7 Вуглеводи – 18,3 Харчові волокна – 1,3	Пацієнти в ОРІТ (сепсис середнього ступеню важкості, респіраторний дистрес-синдром, важка травма) Хірургія (травма, опіки, пери операційне харчування за умови ризику нутритивної недостатності Онкохірургія (голова, шия, великі абдомінальні операції)

Стандарт призначення середовищ для проведення нутритивної підтримки (приклад)*:

Назва методу нутритивної підтримки	Добова кількість харчових середовищ
Ентеральне зондове харчування	Нутрікомп Стандарт: 1-а доба — 500 мл (крапельно), 2-а доба — 1000 мл, 3-а — 1500 мл, 4-а, 5-а і далі — 2000 мл Примітка — вибір типу ентеральної суміші: Показання для застосування ентеральної суміші типу Файбер: • Масивна антибактеріальна терапія • Прогнозований (в післяопераційному періоді) парез кишечника • Явища або ризик розвитку дисбактеріозу • Діарея або закріп на фоні зондового харчування • Підготовка до накладання товстокишкових анастомозів • Підготовка (реабілітація) до хіміо- і радіотерапії • Довготривале (більше 7 діб) ентеральне харчування Показання для застосування ентеральної суміші типу Діабет: • Цукровий діабет • Непереносимість глюкози • Стрессова гіперглікемія • Нейрохірургія, нейротравма • Опікова хвороба Показання для застосування ентеральної суміші типу Гепа: • Ентеральне харчування пацієнтів із гострою і хронічною печінковою недостатністю; • Ентеральне харчування пацієнтів із печінковою енцефалопатією
Ентеральне пероральне харчування	Дієта № ... + Нутрікомп (1,5 ккал/мл) 100–150 мл — 3–4 рази на добу Примітка: (див. вище) — за показаннями застосовуються Нутрікомп Файбер, Діабет або Гепа
Змішане (ентерально-парентеральне) харчування	Нутрікомп менше 1500 мл + Аміноплазмаль Е 10 % — 500 мл + Ліпофундин МСТ/ЛСТ 20 % — 250–500 мл + Глюкоза 20 % — 500 мл Примітка: За наявності дисфункції печінки застосовується Аміноплазмаль Гепа
Повне парентеральне харчування	Аміноплазмаль Е 10 % — 1000 мл Глюкоза 20 % — 1000 мл Ліпофундин МСТ/ЛСТ 20 % — 500 мл Примітка: Виконується за умови неможливості проведення будь-якого варіанту ентерального харчування

Введення ентеральної суміші розпочинають зі швидкості **50 мл/год** в першу добу. Кожну наступну добу швидкість введення збільшують на **25 мл/год**. При цьому максимальна швидкість введення суміші не повинна перевищувати **125 мл/год**. Введення суміші бажано здійснювати протягом 18–20 годин на добу.


* **И.Н. Лейдерман, А.В. Николенко, О.Г. Сивков (2009)** Нутритивная поддержка в отделении реанимации и интенсивной терапии. Стандартные алгоритмы и протоколы. Руководство для врачей. Урало-Сибирская Ассоциация Клинического Питания.




Підготуйте систему для введення ентеральної суміші. Закрийте роликовий регулятор.




Зніміть захисний білий ковпачок з пакету Нутрікомп®.




Приєднайте систему до пакету Нутрікомп®, вставивши пластикову голку в порт пакету.



Обережно натисніть на пакет для відкриття внутрішньої розривної перегородки всередині пакету. Ентеральна суміш потрапить до крапельної камери системи.



Розмістіть пакет Нутрікомп® на штативі. Заповніть систему.



Приєднайте систему до зонда для ентерального харчування. Відкрийте роликовий регулятор. Відрегулюйте оптимальну швидкість подачі суміші Нутрікомп®.

Широкий асортимент готових до використання стандартних і спеціалізованих рідких сумішей для зондового харчування

Назва продукту	Ккал/ 1000 мл	Білок (г)	Жири (г)	Вуглеводи (г)	Волокна (г)	Розподіл калорій (% ккал): Б : Ж : В : Волокна
Стандартні формули						
Нутрікомп® стандарт нейтральний	1000	38	33	138	0	15 : 30 : 55 : 0
Нутрікомп® стандарт фایбер нейтральний	1040	38	33	138	15	15 : 29 : 53 : 3
Нутрікомп® енергія нейтральний	1500	75	50	188	0	20 : 30 : 50 : 0
Нутрікомп® енергія файбер нейтральний	1560	75	50	188	20	20 : 29 : 48 : 3
Спеціалізовані формули						
Нутрікомп® стандарт файбер діабет	1000	41	35	129	20	16 : 31 : 49 : 4
Нутрікомп® гепа	1300	40	58	155	5,6	12 : 40 : 48 : 0
Нутрікомп® імун	1333	67	37	183	13	20 : 25 : 55 : 0

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

ТОВ "Б.Браун Медікал Україна"
м. Київ 03067, бул. І.Лепсе, 4, БЦ "Сільвер Центр"
тел./факс: (044) 351-11-30
e-mail: info@bbraun.kiev.ua
www.bbraun.ua

м. Дніпропетровськ (067) 445 90 22
м. Донецьк (067) 445 89 96
м. Харків (067) 445 89 94
м. Львів (067) 234 02 39
м. Одеса (067) 234 02 35